



ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๑๑๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศรี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเกี่ยวกับการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดนครนายกว่าโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษาเป็นแล้ว เสียชีวิตทุกราย แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทราบดีโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกLOYสุข เมืองคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๓๗-๓๓๓๖๒๘ ต่อ ๒๒ /๐๘๙-๗๔๗๐๕๐๗


โทรสาร. ๐๓๗-๓๓๑๑๔๑



โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษา

เป็นแล้ว เสียชีวิตทุกราย

แต่ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน



การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า

- ฉีดผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด เช่น สัตวแพทย์ บุรุษไปรษณีย์ จนท.ทำงานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า เด็ก

2. ฉีดหลังการสัมผัสโรค

- พิจารณาความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



ฉีดวัคซีนหลังการสัมผัสโรค พิจารณาความรุนแรงของบาดแผล




สรุป การฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคหลังการสัมผัส

1. การสัมผัสที่ไม่ติดเชื้อ = ไม่ต้องฉีดวัคซีน

2. การสัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อ = น้ำลาย สารคัดหลั่ง สัมผัสรอยถลอก รอยข่วน แผล เยื่อเมือก หรือถูกกัดโดยฟันสัตว์ทะเลผิวหนัง ปฏิบัติดังนี้


- กรณีที่ต้องฉีดวัคซีนจนครบ จากการสัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อในลักษณะ ดังนี้
 - สุนัข/แมว มีการกัดปกัด หรือหนีเสียเปลี่ยนไป
 - สัตว์จรจัด สัตว์ป่า หนู ค้างคาว สุนัข/แมว ที่กัดแล้วหนีหาย หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้
 - ผลการตรวจสอบ DFA ให้ผล +
 - ผลการตรวจสอบ DFA ให้ผล - แต่มีความผิดปกติ สัตว์ตาย บาดแผลฉกรรจ์
- กรณีที่ฉีดวัคซีนครบ 10 วัน สุนัข/แมว ที่กักขังอาการเป็นปกติ ให้หยุดฉีดวัคซีนได้

ดาตา 5 ย ป้องกันสุนัขกัด



ย1

อย่าแหย่
สุนัขให้โมโห



ย2

อย่าแหย่
หาง นิ้ว ตั้ว ๆ
หรือทำให้สุนัขตกใจ



ย3

อย่าแหย่
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



ย4

อย่าหยิบ
จานข้าว หรือ
เคลื่อนย้ายอาหาร
ขณะสุนัขกำลังกิน



ย5

อย่ายุ่ง
หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือ ไม่มีเจ้าของ



“ถูกกัด - ช่วน
อย่างรีบร้อนใจ
ต้องไปหาหมอ
มิฉะนั้นอาจตายได้”



เมื่อถูกสุนัขหรือแมลง กัด ช่วน ต้องทำดังนี้




01

ล้างแผลด้วย
สบู่และน้ำสะอาด
หลายๆ ครั้งอย่างเบามือ



02

ทายา
เบตาดีน



03

รีบไปพบแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว



04

กักขัง แมว-แมว
ไว้ดูอาการ 10 วัน
หากตายต้องส่งตรวจ
หาเชื้อพิษสุนัขบ้า



05

กรณีสงสัยว่าสัตว์
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือสัตว์ตาย
ในนี้จึงเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ทันที



“ถูกกัดรีบล้างแผล ใส่ยา
รักษา ฆ่าเชื้อ
รีบฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า”

สัตว์ที่กินปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่คงตามกำหนดปศุสัตว์



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า

การติดต่อ

- สัตว์ป่วยแพร่เชื้อทางน้ำลาย
 - คนหรือสัตว์ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด ข่วน น้ำลายสัมผัสมีบาดแผล
- เชื่อบุตา จมูก ปาก



อาการในคน

- แสดงอาการหลังรับเชื้อ 3 สัปดาห์-6 เดือน 1 ปี
- เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย คันปากแสบ
- กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม
- ไม่ชอบเสียงดัง กลืนน้ำลาย กลืนลำบาก
- ปวดท้องน้อย กล้ามเนื้อขากระตุก
- แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก
- เกร็ง อัมพาต
- เสียชีวิต



สัตว์นำโรค



สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด