



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Anthrax

โรคแอนแทรกซ์



[เป็นโรคติดต่อร้ายแรง] ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในดิน น้ำ และวัสดุจากพืช สัตว์ เชื้อทนความร้อน และเป็นได้ดีสปอร์ของเชื้อสามารถอยู่ในดินได้ยาวนานกว่า 10 ปี

การติดต่อ

- การสัมผัสสัตว์ หรือซากหละที่ป่วย หรือตายจากโรคแอนแทรกซ์
- การรับประทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อ
- ติดจากการหายใจ เอาฝุ่นดิน หรือซากสัตว์ ที่มีสปอร์ของเชื้อเข้าไป

ระยะเริ่ม 1-5 วัน

สัตว์มักจะป่วยกะทันหัน โด กระบือ แมะ แกะ

กลุ่มเสี่ยง

- คนฆ่าหละสัตว์
- คนที่ชอบกินเนื้อดิบ
- สัตวแพทย์ สัตวบาล
- คนเลี้ยงสัตว์
- คนทำงานในโรงหนัง ขน หรือกระดูกสัตว์ป็น

ทางป้องกัน



- หลีกเลี่ยงการสัมผัส **โค กระบือ แมะ แกะ**
- ล้างมือชำระร่างกาย **หลังสัมผัสสัตว์**
- เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง **อาหารปลอดภัย**
- หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ **ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ห้ามฆ่าและซากสัตว์**
- หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

“ ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ ”

ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองควบคุมโรค



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค



3 เสี่ยง

เสี่ยงแอนแทรกซ์



สัตว์เสี่ยง!

สัมผัส
เลือด
หนอง
ผิวหนัง
กินเนื้อดิบ



วัว



กระบือ



แพะ



แกะ



ม้า



อาหารเสี่ยง!

กินสุกๆดิบๆ
ไม่รู้แหล่งที่มา
ไม่ปรุงสุก



ก้อยเนื้อ



ชอยจู้



หนังเค็ม



คนจะไม่ “เสี่ยง” ถ้า...



ล้างมือ
ให้สะอาดด้วยสบู่



ชำระล้างร่างกาย
ทุกครั้งหลังการสัมผัส



สวมอุปกรณ์ป้องกัน
เมื่อมีโอกาสสัมผัสสัตว์



ทานสุก ไม่ทานดิบ
ปรุงสุก สะอาดทุกครั้ง



ไม่สัมผัสสัตว์ตาย
โดยไม่ทราบสาเหตุ



FACEBOOK



WEBSITE

เผยแพร่ข้อมูล

วันที่ 10 เมษายน 2567
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4221 9168

1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค